

## **HANTAVIRUSOVÉ INFEKČIE S RENÁLNYM SYNDRÓMOM – EPIDEMIOLOGICKÝ PROBLÉM?**

L.Lešková<sup>1</sup>, M.Toperczerová<sup>2</sup>, K.Gurský<sup>1</sup>, P.Mizla<sup>2</sup>, A.Rajnič A.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>NDC Logman a.s. Prešov, <sup>2</sup>Nefrologická klinika Logman a.s. a UPJŠ Košice

Hantavírusové infekcie sú príčinou hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom /HHRS/, hantavírusového pľúcneho syndrómu /HPS/ a epidemickej nefropatie /NE/. V Európe sa najčastejšie vyskytujú kmeňe Puumala a Dobrava. Diagnóza sa zakladá na serologickom vyšetrení.

Autori v lete zachytili epidemický výskyt hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom a epidemickej nefropatie v regióne kraja Košice a Prešov. Vo svojej práci na súbore 33 pacientov /obdobie r.2004-2007/ prezentujú polymorfný klinický obraz hantavírusových infekcií z rôznym orgánovým postihnutím. /obličky, pečeň, pľúca, CNS/ Liečba bola u 26 pacientov symptomatická, 7 pacienti vyžadovali podpornú mimotelovú eliminačnú liečbu. Ireverzibilné poškodenie obličiek s potrebou chronickej hemodialyzačnej liečby sme zaznamenali u jedného pacienta s prekonanou HHRS.

**Záver:** Pri horúčnatých ochoreniach s akútnou renálnou insuficienciou a trombocytopéniou je nutné pomýšľať na hantavírusové infekcie vzhľadom na ich vzrastajúcu incidenciu.